

静脉留置针

患者参考信息



什么是留置针？

留置针通常称为venflon™，是一种插入静脉的小型塑料软管。留置针将您无法通过口服摄取，或需要直接进入血液的药物或流质直接输入您体内。留置针外侧有一彩色小帽。小帽一定要保持关闭，以防传染。

如何插入留置针？

因为留置针刺穿了身体抵抗传染的天然防线（皮肤），所以它插入时必须是清洁的。否则，存在传染的风险。

- ◆ 插入留置针应由受过培训的专业护士进行
- ◆ 选择合适插入的静脉血管（尽量远离关节处）
- ◆ 护士用肥皂和水或酒精凝胶/洗手液洗手，戴上一次性手套和围裙
- ◆ 利用推荐的产品清洁皮肤上相关区域
- ◆ 用绷紧的压脉带缠住手臂，便于护士选择最合适的静脉血管
- ◆ 用针头将留置针透过皮肤插入静脉血管，待其就位，再将针头除去，血管中只保留留置针
- ◆ 用生理盐水冲洗留置针，确保其能正常工作
- ◆ 用胶带固定留置针在相应位置。胶带应开有透明窗，便于观察。插入留置针的日期应写在胶带上

留置针会在体内停留多久？

待您的治疗结束，留置针会被取出。如果留置针工作不正常，可能需要更换。每隔72小时应进行例行更换。特殊情况下，留置针可停留更久（主管治疗的人员会向您具体解释有关情况）。

工作人员必须：

- ◆ 确保您只使用一只留置针，如果绝对必要的话
- ◆ 在碰触您的留置针之前和之后都洗手
- ◆ 确保彩色小帽关闭
- ◆ 定时检查留置针部位，至少每天在您的记录上登记一次
- ◆ 治疗结束时取出留置针，如果您觉得针有问题或未正常工作，以及留置针置入超过72小时，都应将其取出
- ◆ 确保使您了解有关留置针的必要情况，以及该如何对待它
- ◆ 输入药物之前和之后都用生理盐水冲洗留置针
- ◆ 确保在您回家之前取出留置针

我能做些什么？

- ◆ 请勿触碰留置针
- ◆ 有任何疑问请不吝垂询，如有护士在触碰留置针前未洗手，一定要当面指出
- ◆ 注意不要碰撞或拉扯留置针
- ◆ 保持胶带清洁干燥
- ◆ 如果胶带变湿变脏请通知工作人员
- ◆ 如果您感到置入留置针的部位疼痛、发热、肿胀或发红，请通知工作人员
- ◆ 如果留置针上的小帽敞开，请通知工作人员

本手册中的未尽事宜，请向工作人员咨询。

传染控制

联系电话

Hairmyres医院

电话： 01355 584641/47

Monklands医院

电话： 01236 712240

Wishaw综合医院

电话： 01698 366408

基层医疗组：

Cleland医院

电话： 01698 863269

保健小组

Lanarkshire NHS委员会

电话： 01698 206336

Pub. date:	November 2010
Review date:	November 2012
Issue No:	03
Department:	Infection Control

Translated by Global Language Services Ltd
Oct 2009 (Version 2)